

## MAXICÉN E EKOCÉN PROTEGGONO L'AMBIENTE

MAXICÉN È UN FERTILIZZANTE INNOVATIVO E DEVE ESSERE APPLICATO NEI PERIODI E NELLE CIRCOSTANZE IN CUI SI APPLICANO I CONCIMI TRADIZIONALI

### USO: Dosi per ettaro o come indicato.

Per la loro applicazione, bisogna usare la stessa quantità d'acqua che si usa per i fitosanitari in generale.

Tutti i MAXICEN e EKOCEN possono essere mischiati con qualsiasi tipo di fitosanitario.

IN PICCOLI APPEZZAMENTI, UN TAPPO DEL FLACONE PER UNO ZAINO DA 15 L.

È **INDISPENSABILE** per la legatura del frutto e la produzione applicare il MAXICEN sul fiore a la fioritura: frutteti, ortaggi, meloni, cetrioli, cocomeri, zucchine, pomodori, fagiolini, fragole, citrici, mandorli, olivi, tropicali, ecc.

### CEREALI:

- **Riso:** 2 flaconi di 20 prima de la semina, + 2 flaconi di 20 sulle foglie dopo la nascita, da soli o insieme all'erbicida.

- **Mais:** 2 flaconi di 20 prima della semina e altri 2 di 15 raggiunti i 30-60 cm. di altezza approfittando un trattamento. Per mais foraggero, 4 di 9.

- **Grano, orzo, avena, segale, sorgo:** 1-2 flaconi di MAXICEN per ettaro con il secchio dell'erbicida prima della semina o dopo la nascita, la quantità d'acqua è la stessa usata per gli erbicidi e si può anche mischiare con questi ultimi. A metà coltivazione, 1-2 di 15 per ettaro con o senza l'erbicida. Durante la fioritura, mezza flacone di MAXICEN per ettaro.

- **Girasole:** 1 flacone di MAXICEN per un ettaro, direttamente sui semi senza aggiungere acqua. Può applicarsi lo stesso giorno della semina o vari giorni prima.

### FRUTTETI:

- **Mandorlo, noce, nocciolo:** 1-2 flaconi di 15 prima della fioritura. Successivamente, in caso di produzione abbondante, 1 flacone di 4 sul terreno, per gocciolamento o sulle foglie.

- **Citrici, aranci, mandarini, pompelmi, limoni, ecc.:** in inverno, 2 flaconi di MAXICEN sul terreno, per gocciolamento o sulle foglie. A metà coltivazione, 2 flaconi di 20 + 1 di 4 sul terreno, per gocciolamento o sulle foglie. Su clementine ed erandine a metà coltivazione spargere 1 di 10. Su **limoni**, 2 di 20 + 2 di 15. Tutti i MAXICEN si possono mischiare con qualsiasi tipo di fitosanitario.

- **Citrici tardivi (mandarini, aranci, limoni, ecc.):** usare 4, 20 e 10 per effetti sull'ingrassamento, zucchero, colore e ritardo del raccolto.

- **Citrici anticipati (mandarini, aranci, limoni, ecc.):** usare 4, 20 e 13 per effetti sull'ingrassamento, zucchero, colore e anticipo del raccolto.

- **Meli e fichi:** 2 flaconi di MAXICEN prima della fioritura sul terreno o sulle foglie. Dopo il riempimento e la legatura del frutto, 1 di 10 + 1 di 4 sulle foglie. Nella mela rossa, 1-2 flaconi di 13 sulle foglie. Nei fichi 2 di 9 all'inizio e 1 di 10 a metà coltivazione.

- **Peschi e nettarini:** 2 flaconi di MAXICEN prima della fioritura sul terreno o sulle foglie. Una volta che il frutto si è riempito, 1 di 20 + 1-2 di 4 sulle foglie.

- **Olivi:** 1-2 flaconi di 15 per 100 olivi in inverno, con o senza erbicida, sul terreno, sulle foglie o polverizzato sul tronco. Nel mese di settembre/ottobre, 1-2 flaconi di MAXICEN sul terreno, sulle foglie o polverizzato sul tronco dell'olivo con uno spray. Per il terreno, **usare una pistola con dosatore ed applicare 1'4 cc. di MAXICEN per albero, applicandosi alla terra ad un metro dal tronco.** Per la legatura del frutto 1 flacone di 20 durante la fioritura sulle foglie.

- **Olivo intensivo:** 2 flaconi di 15 in inverno e due MAXICEN a metà ingrassamento.

- **Pero, ciliegio, albicocco, melagrano, prugno, cachi:** 1-2 flaconi di MAXICEN prima della fioritura sul terreno o sulle foglie. Una volta che il frutto si è riempito, 1-2 flaconi di 20 sulle foglie. Nel ciliegio + 1-2 flaconi di 13 sulle foglie.

### ORTAGGI:

- **Fagiolini, fagioli, melanzane, broccoli, bietole, cavoli, cavolfiori, borragini, cardi, carciofi, piselli, peperoni:** 1-2 flaconi di MAXICEN all'inizio. A metà coltivazione, 5 ml. di 4 in 15 litri d'acqua, sulle foglie, bisogna effettuare varie applicazioni. Nei carciofi: a metà coltivazione, 2 flaconi di 9 + 1 flacone di 4. Nei broccoli: 2 MAXICEN + 2 di 9 per anticipare il raccolto.

- **Patata, zucca, cipolla, aglio, porro, carota, ravanella, rapa:** 2 flaconi di 20 durante la semina e altre 2 flaconi di 15 a metà coltivazione. Si possono usare tutti e quattro contemporaneamente all'inizio.

- **Lattuga, scarola, asparago, cuore di palma:** 2 flaconi di MAXICEN per ettaro all'inizio; si possono spargere sulla foglia o sul terreno, solamente sul terreno o per gocciolamento. A metà coltivazione, altre 2 flaconi di 20 sulle foglie o per gocciolamento. Nella scarola di 9.

- **Melone, cocomero, zucca:** 2 flaconi di MAXICEN per ettaro, all'inizio. Quando i primi meloni raggiungono i 5-10 cm. versare 1 flacone di 20 e 1 flacone di 4 per ettaro. Nei piccoli appezzamenti, 3 ml. di 20 più 3 ml. di 4 in 15 litri d'acqua, bisogna effettuare varie applicazioni.

- **Pomodoro, cetriolo, zuccina:** In serre, 2 flaconi di MAXICEN per ettaro, all'inizio, sul terreno o sulla foglia. Successivamente, nei pomodori e cetrioli, quando i vari mazzetti siano in fioritura, versare 5 ml. di 4 in 15 litri d'acqua ogni 20 giorni. Nelle zucchine, 5 ml. di 4 in 15 litri d'acqua **ogni settimana.**